



Strabismus / Squint

"Straighten the focus, Brighten the future"



What is Squint ?

Misalignment of the eyes inward or outward that can lead to double vision, lazy eyes or loss of depth perception.



When to screen for Squint ?

- If child shows signs like misaligned eyes or tilting of head to focus.
- Following an eye injury or vision problem at any age.



Risk Factors ?

- Premature birth
- Refractive errors
- Family history
- Neuro developmental delay
- Medical conditions (eg : cerebral palsy)



Treatments ?

- Glasses
- Vision therapy
- Corrective surgeries
- Botulinum toxin injections to temporarily realign the eyes

Why follow up visits ?

- Regular follow ups every 3-6 months.
- To prevent vision loss from coming back
- Early and consistent care gives the best results.





அச்சுதா ஜீ கேர்

ஸ்ட்ராபிஸ்மஸ் / மாறுகண்

கவனத்தை நேராக்குங்கள், எதிர்காலத்தை பிரகாசமாக்குங்கள்



மாறுகண் என்றால் என்ன ?

இரு கண் நேராக பார்க்கும் பொழுது மற்றொரு கண் மாறுபட்ட திசையில் இருப்பது மாறுகண் எனப்படும். இதனால் இரட்டை பார்வை சோம்பேரி கண் வர வாய்ப்புள்ளது.



கண் பார்வை எப்போது பரிசோதனை செய்ய வேண்டும்?

யாவர்ல்லாம் பரிசோதிக்க வேண்டும்?

- குழந்தைகள்
- குடும்பத்தில் யாருக்காவது மாறுகண் இருந்தால்
- தீட்டிரென மாறுகண் அல்லது இரட்டை பார்வை ஏற்படுவர்களுக்கு



ஷப்துகாரணிகள் ?

- குறைமாத பிறப்பு
- பார்வைத் திறன் குறைபாடு
- குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு மாறுகண் இருந்தால்
- நரம்பியல் வளர்ச்சி குறைபாடு
- பெருமளவு வாதம் போன்ற மருத்துவ நிலை



சிகிச்சைகள் ?

- கண்ணாடு
- கண் பயிற்சிகள்
- அறுவை சிகிச்சை
- தற்காலிக தீவ்வாக பாட்டுவினம் பாக்சின் ஊசி

கண்டறியாவிடால்?

- சோம்பேரி கண் மற்றும்
- ஒரு பொருள் தொலைவில் இருக்கிறதா, அருகில் இருக்கிறதா என்பதைக் கணிக்க முடியாமல் போகலாம் (Loss of 3D Vision)

